

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ СРЕДНЕГО ОТДЕЛА ГОРТАНИ T₁N₀M₀

Семенов С.А., Дайняк Н.П., Куликов А.В

Среди больных злокачественными опухолями головы и шеи первое место занимает рак гортани (22,9%) (А.В. Ваккер, 2002). При лечении больных с локализованной формой рака гортани (T₁₋₂N₀M₀) с успехом используются как лучевой, так и хирургический методы лечения (А.И. Пачес, 2000; В.С. Алфёров, 2000).

Целью данного исследования было определить эффективность различных методов лечения рака среднего отдела гортани T₁N₀M₀ среди больных пролеченных в Витебской области в 1993-1997гг.

В Витебской областной клинической больнице в 1993-1997гг. находилось 35 пациентов, у которых был диагностирован рак среднего отдела гортани T₁N₀M₀. У 27 больных, которые прошли полный курс лечения, нам удалось проследить 5-летнюю выживаемость, как критерий эффективности лечения.

У 6-ти больных, которые прошли курс лучевой терапии по радикальной программе (70 Гр), диагноз был установлен путем предварительно проведенной биопсии. Из них - 5 пациентов живы, в сроки наблюдения более 5 лет. У одного возник рецидив опухоли и ему была произведена ларингэктомия. Несмотря на проведенное лечение этот больной умер через 2 года, после первичной постановки диагноза.

6-ти больным диагноз был установлен при микроэндоларингальном иссечении новообразования. Все они прошли курс лучевого лечения по радикальной программе (60 Гр). Все пациенты этой группы оказались живы в сроки наблюдения более 5 лет.

Хордэктомия была произведена 12-ти больным после микрови-деоларингостробоскопии. Предварительно этим больным была проведена биопсия. Диагноз был подтвержден после хордэктомии. В послеоперационном периоде эти больные получали лучевую терапию в дозе 40 Гр. Среди пациентов этой группы - 11 живы, в сроки наблюдения более 5 лет, один больной умер через 3 года.

У 3 больных после установления диагноза путем биопсии выполнены различные варианты вертикальных резекций гортани. Больные этой группы живы в сроки наблюдения более 5 лет.

Таким образом, все используемые методы лечения рака среднего отдела гортани T₁N₀M₀ в Витебской области достаточно эффективны. По нашему мнению, предпочтение следует отдать микроэндоларингеальному иссечению новообразования и лучевой терапии по радикальной программе.